

Super Safe核酸染料

货号: PMK0852

保存: 4°C干燥避光, 有效期24个月。

规格: 500ul

用途: 适用于电泳分析。

产品简介:

Super Safe (可替代Sybr Safe) 是一种新型核酸染料。Super Safe主要成分是花菁染料, 实验显示在凝胶染色浓度下没有发现诱变性, 具有使用相对安全、检测灵敏等特点, 可以作为各种核酸电泳的染色剂, 适用于各种片段大小染色。与标准凝胶成像系统和可见光激发的凝胶观察装置完美兼容, 适用于紫外凝胶成像系统或蓝色可见光激发的凝胶观察装置。

产品特点:

1. 相对安全: 尽管可以穿透细胞膜进入细胞内, 属于花菁染料, 使用相对安全, 实验显示在工作浓度(凝胶染色浓度)下无致突变性, 可以代替致癌物溴化乙锭EB作为各种核酸电泳的染色剂。
2. 灵敏度高: 适用于各种大小片段的电泳染色, 对核酸迁移的没有任何影响。
3. 稳定性高: 适用于使用微波或其它加热方法制备琼脂糖凝胶; 室温下在酸或碱缓冲液中极其稳定, 耐光性强。
4. 信噪比高: 样品荧光信号强, 背景信号低。
5. 操作简单: 在预制胶和电泳过程中不降解, 可直接用可见光凝胶透射仪观察。
6. 适用范围广: 可选择电泳前染色(胶染法)或电泳后染色(泡染法); 适用琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶电泳; 可用于dsDNA、ssDNA 或RNA 染色。
7. 仪器兼容: 适用于使用254nm 激发的紫外凝胶成像系统或蓝色可见光激发的凝胶观察装置。和SYBR Green 的光谱相似。

操作步骤:

一、琼脂糖凝胶电泳染色(推荐方法)

将Super Safe Nucleic Acid Dye加入凝胶中

1. 制胶: 按常规操作, 制备琼脂糖凝胶, 加入浓缩的10,000x Super Safe Nucleic Acid Dye, 使其在凝胶中的终浓度为1x(例如: 制备50ml的凝胶, 加入染料5 μ l), 轻轻摇匀, 倒胶。
2. 按常规方法电泳, 观测结果(染料不会影响使DNA迁移!)。

二、泡染法

1. 按照常规方法进行电泳。
2. 用H₂O将10,000x Super Safe Nucleic Acid Dye储液稀释约3,300倍到纯水中, 制成3x染色液。
3. 将凝胶小心地放入合适的容器中, 如聚丙烯容器中。缓慢加入足量的3x染色液浸没胶。室温振荡染色30min左右。
4. 在凝胶成像仪内, 观测结果

注意事项:

1. 由于Super Safe 具有良好的热稳定性, 可以在热的琼脂糖溶液中直接添加, 而不需要等待溶液冷却。

产品说明书

- 摇晃，振荡或者翻转以保证染料充分混匀。也可以选择将Super Safe 储液加到琼脂糖粉末和电泳缓冲液中，然后用微波炉或其他常用方式加热以制备琼脂糖凝胶。Super Safe 兼容所有常用的电泳缓冲溶液。
2. 如果条带总是弥散或分离不理想，请使用泡染法染色以确认问题是否与染料有关。如果染色后问题依旧存在，则说明问题与染料无关，请尝试：降低琼脂糖浓度；选用更长的凝胶；延长凝胶时间以保证边缘清晰；改进上样技巧或选择泡染法染色。
3. Super Safe对玻璃器皿和非聚丙烯材料具有一定的亲合力。建议在稀释、贮存、染色等使用过程中用聚丙烯类容器。对于聚丙烯酰胺凝胶请使用泡染法。

相关产品：

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺 (29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解，请关注公众号：